

## Alakulmahampaat painavat kitalakeen tai ikeneen

Tällaisen purentavian syynä on yleensä kapea ja lyhyt alaleuka ja/tai alakulmahampaiden liian pysty asento (linguoversio). Vikaa pidetään perinnöllisenä, mutta periytymiskaavaa ei tunneta. Ongelmana on kitalakeen tai yläikeneen aiheutuva pehmytosavaurio, joka aiheuttaa koiralle kipua ja voi pahimmillaan johtaa avanteen muodostumiseen nenäonteloon asti (oronasaalisteli).

### Maitohampaat

Jos ongelma havaitaan jo maitohampaissa, voidaan alaleuan maitokulmahampaat poistaa jopa ennen pysyvien hampaiden puhkeamista. Jos pysyvä hammas on jo puhjennut, maitohammas tulisi poistaa mahdollisimman pian ellei se selvästi heilu! On tärkeää, että maitohampaan juuri saadaan kokonaan ulos, jotta se ei estäisi pysyvää hammasta tulemasta oikealle paikalleen. Siksi maitohampaan leikkauksellinen poisto on suositeltavampi kuin perinteinen poisto. Kyseessä on ennaltaehkäisevä oikomishoito.

### Pysyvät hampaat

Lievä pysyvien alakulmahampaiden linguoversio voi korjaantua siten, että alakulmahampaita painellaan kotona sormin ulospäin ja koiraan motivoidaan pitämään suussa palloa tai gongia, joka kääntää hampaita ulospäin. Pallon/gongin koko on tärkeä: se ei saa aivan mahtua alakulmahampaiden väliin mutta sen tulee istua hyvin heti niiden taakse. Pallon tai gongin pureskelu 15 min kerrallaan 2-3 kertaa pvässä voi aiheuttaa jopa 5-6 mm siirtymän muutamassa viikossa!

### Vakavamman purentavian hoitovaihtoehtoja on kolme:

#### 1. Alakulmahampaiden lyhennys ja pulpa-amputaatio/juurihoito

Alakulmahampaan kruunuosaa lyhennetään niin, että se ei enää osu kitalakeen tai ikeneen. Hoito on suositeltava aikaisintaan 7 kk iässä, kun juuren pää on sulkeutunut. Lyhennettyyn hampaaseen tehdään joko pulpa-amputaatio (jolloin hammas säilyy elävänä, mutta ennuste on epävarmempi ja kontrollien tarve tiheämpi) tai juurihoito.

#### 2. Oikominen

Oikominenkin voidaan aloittaa aikaisintaan 7 kk iässä. Suuhun valmistetaan oikomiskoje, ja kontrollissa käydään 2-4 viikon välein. Oikominen kestää yleensä noin 2-4 kk. Anestesiaa tulee useita. Koira ei hoidon aikana saa purra mitään kovaa ja suuhygieniasta on pidettävä hyvää huolta. Oikominen on hoitovaihtoehtoista selkeästi hintavin ja vaatii omistajalta suurta paneutumista, mutta toisaalta vaiva on yleensä kokonaan poissa hoidon päätyttyä. On muistettava, että oikomishoidolla muutetaan koiran perinnöllistä ilmiä, joten koira ei sen jälkeen tulisi käyttää jalostukseen.

### 3. Alakulmahampaiden poisto

Alakulmahampaat ovat koiran tärkeimmät hampaat, koska niiden juuret muodostavat suuren osan alaleuan rakenteesta. Siksi niiden poisto on näistä kolmesta hoitovaihtoehdosta vähiten suositeltava.

---

Artikkelin kirjoittaja: [Mari Koljonen, ELL](#)

© 2008 Apex Malmin Eläinklinikka. Lyhyt lainaus artikkelista sallitaan, kun artikkelin kirjoittaja Mari Koljonen, Malmin Eläinklinikka Apex ja kirjoitusvuosi 2008 mainitaan. Koko artikkelin kopiomisesta web-sivuille tai muuhun käyttöön on aina sovittava kirjoittajan kanssa.